

## FICHE TECHNIQUE

### MELANGE « JOUR DE FÊTE »

#### **1) LE MELANGE EST COMPOSE DE :**

- COSMOS SENSATION VARIES
- CENTAUREES BARBEAU VARIES
- ZINNIAS VARIES

#### **2) LE DOSAGE :**

4 kg/ha de mélange

#### **3) CALENDRIER DES ACTIONS A MENER POUR L'IMPLANTATION DU MELANGE**

**DEBUT AVRIL** : Une préparation du sol qui permet d'obtenir un sol assez fin. Il est conseillé de labourer suivi d'un passage de herse ou un décompactage puis un passage de herse.

**MI-AVRIL** : Faire un 2<sup>ème</sup> passage de herse sur le terrain nu pour réaliser un faux semis

#### **UNE SEMAINE AVANT LE SEMIS :**

- Un traitement de BONALAN 5L/ha (benfluraline : 180g/l) OU TREFLAN 1 à 2,5 L/HA (trifluraline : 480g/l application fin mars) OU KERB FLO 1 à 3L/HA (propyzamide : 400g/l)
- Un travail du sol au maximum sur 10 cm (ex herse) après le traitement de façon à incorporer le produit

**OU APRES LE SEMIS** : Un traitement KERB FLO 0,8l/ha (propyzamide : 400g/l) au plus tard 2 jours après le semis.

#### **LE SEMIS SI POSSIBLE EN AVRIL :**

- le semis du mélange à l'aide d'un semoir de type « colza » ou d'un épandeur à micro-granules et rouler

#### **4) LA FLORAISON :**

Elle intervient de juillet jusqu'aux premières gelées. La hauteur du couvert est de 0,5 à 1,2 m.

## FICHE TECHNIQUE

### MELANGE « DOUCE FRANCE »

#### **1) LE MELANGE EST COMPOSE DE :**

- ESCHSCHOLTZIAS CALIFORNICA VARIES
- CENTAUREES POLKA DOT
- SOUCIS
- ZINNIAS VARIES

#### **2) LE DOSAGE :**

4 kg/ha de mélange

#### **3) CALENDRIER DES ACTIONS A MENER POUR L'IMPLANTATION DU MELANGE**

**DEBUT AVRIL** : Une préparation du sol qui permet d'obtenir un sol assez fin. Il est conseillé de labourer suivi d'un passage de herse ou un décompactage puis un passage de herse.

**MI-AVRIL** : Faire un 2<sup>ème</sup> passage de herse sur le terrain nu pour réaliser un faux semis

#### **UNE SEMAINE AVANT LE SEMIS :**

- Un traitement de BONALAN 5L/ha (benfluraline : 180g/l) OU TREFLAN 1 à 2,5 L/HA (trifluraline : 480g/l application fin mars) OU KERB FLO 1 à 3L/HA (propyzamide : 400g/l)
- Un travail du sol au maximum sur 10 cm (ex herse) après le traitement de façon à incorporer le produit

**OU APRES LE SEMIS** : Un traitement KERB FLO 0,8l/ha (propyzamide : 400g/l) au plus tard 2 jours après le semis.

#### **LE SEMIS SI POSSIBLE EN AVRIL :**

- le semis du mélange (à l'aide d'un semoir de type « colza » ou d'un épandeur à micro-granules et rouler

#### **4) LA FLORAISON :**

Elle intervient de juillet mi-août pour les eschscholtzia-centaurée-zinnia. Puis, de juillet-à début de l'hiver pour les soucis La hauteur du couvert est de 0,4 à 0,6 m.

## DEMANDE DE REALISATION

### D'UNE JACHERE FLEURIE

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

#### NOTIFICATION DES DONNEES ADMINISTRATIVES DE LA JACHERE :

COMMUNE	PARCELLE (SECTION + N°)	NOM DE LA JACHERE FLEURIE	SURFACE DE LA PARCELLE

**Il est demandé de joindre une photographie au 1/5000<sup>ème</sup> (à partir du dossier PAC) afin de pouvoir visiter la mise en place sur le terrain de la ou des jachères fleuries sur la ou les parcelles concernées.**